SOLUTION DES MOINDRES CARRÉS (D'UN SYSTÈME LINÉAIRE) (A3, A4, A11)
 (10 / 01 / 2020, © Monfort, Dicostat2005, 2005-2020)

(i) Soit un **système linéaire** :

$$(1) \quad A x = b$$

dans lequel $A \in M_{mn}(\mathbf{R})$ et $b \in \mathbf{R}^m$ sont donnés. On note $S(A, b)$ l'ensemble des solutions de (1), q la **forme quadratique** associée à la **matrice** unité I_m :

$$(2) \quad u \in \mathbf{R}^m \mapsto q(u) = u' u \in \mathbf{R}$$

et $\| \cdot \|$ la **norme** associée à q , définie par $\|u\| = (u' u)^{1/2}$.

Si $S(A, b) \neq \emptyset$ (système sans solution algébrique « ordinaire »), on appelle **solution des moindres carrés (ordinaires)**, ou **pseudo-solution**, du système (1) tout vecteur $\tilde{x} \in \mathbf{R}^n$ tq :

$$(3) \quad q(A \tilde{x} - b) \leq q(A x - b), \quad \forall x \in \mathbf{R}^n,$$

ie tq :

$$(4) \quad q(e(\tilde{x})) = \inf_{x \in \mathbf{R}^n} q(e(x)), \quad \forall x \in \mathbf{R}^n,$$

où $e(x) = A x - b$ est appelé **vecteur d'écart** associé à x , $\forall x \in \mathbf{R}^n$, ou encore **fonction résidu(elle)**, ou **fonction d'écart** du système (1) (cf schéma ci-après).

(ii) La notion précédente procède de l'idée suivante. $S(A, b) = \emptyset$ parce que $A x \neq b$. Par suite, $\forall x \in \mathbf{R}^n$, il existe une fonction $e : \mathbf{R}^n \mapsto \mathbf{R}^m$ tq $A x + e(x) = b$. Le scalaire $q(e(x))$ est appelé **déviations des moindres carrés (ordinaires)** de l'équation (1) au point x .

On montre que $\tilde{x}$ est **solution des moindres carrés ordinaires** de (1) ssi :

$$(5) \quad A \tilde{x} = \text{pr}_{\text{Im}(A)} b \quad (\text{projection de } b \text{ sur l'image de } A)$$

(iii) Plus généralement, soit Q une **matrice définie positive** ($Q \in D_m^+(\mathbf{R})$), q_Q la forme quadratique associée à Q selon :

$$(2)' \quad u \in \mathbf{R}^m \mapsto q_Q(u) = u' Q^{-1} u \in \mathbf{R},$$

et $\|\cdot\|_Q$ la norme associée à q_Q et définie par $\|u\|_Q = (u' Q^{-1} u)^{1/2}$.

On appelle **solution des moindres carrés généralisés**, ou **pseudo-solution dans la métrique Q** , du système (1) un vecteur $\tilde{x} \in \mathbf{R}^n$ tq :

$$(3)' \quad q_Q(A \tilde{x} - b) \leq q_Q(Ax - b), \quad \forall x \in \mathbf{R}^n,$$

ou, de façon équivalente, tq :

$$(4)' \quad q_Q(e(\tilde{x})) = \inf_{x \in \mathbf{R}^n} q_Q(e(x)), \quad \forall x \in \mathbf{R}^n.$$

(iv) Les notions précédentes sont associées à celle de **matrice pseudo-inverse**.

En **Statistique**, ainsi qu'en calcul numérique (systèmes d'équations « mal conditionnés »), les méthodes de résolution utilisent souvent les solutions de moindres carrés (cf **méthode des moindres carrés**, **méthode des moindres carrés ordinaires**, **méthode des moindres carrés généralisés**, etc).